

温泉分析書

（鉱泉分析試験による分析成績）

別紙（30-502-2 1604-01）

1.源泉名及び湧出地：	源泉名	弥富温泉
	採水地	弥富市稲元六丁目25番地

2.湧出地における調査及び試験成績					
（イ）調査及び試験者：	登録番号	愛知県第1号愛知県衛生研究所	小池恭子		
（ロ）調査及び試験年月日：	平成30年10月23日				
（ハ）泉温：	源泉	46.6℃（気温：19℃）			
	公共の浴用に供する場所	45.0℃～48.0℃	（ニ）湧出量：	260 L/min	（動力）
（ホ）知覚的試験：	僅微黄色、澄明、殆ど無臭、発泡あり		（ヘ）pH値：	8.0	
（ト）電気伝導度：	45.5 S/m	（25℃）	（チ）ラドン（Rn）	：未測定	

3.試験室における試験成績					
（イ）試験者：	登録番号	愛知県第1号愛知県衛生研究所	長谷川 真照、尾内 彩乃		
（ロ）分析終了の年月日：	平成30年11月12日				
（ハ）知覚的試験：	僅微黄色、澄明		（ニ）密度：	0.9984 g/cm ³	（20℃/4℃）
（ホ）RpH値：	8.26		（ヘ）蒸発残留物	： 0.332 g/kg	（110℃）

4.試料1kg中の成分：分量及び組成					
（イ）陽イオン					
成分	ミリグラム（mg）	ミリバル（mval）	ミリバル％（mval％）		
ナトリウムイオン（Na ⁺ ）	114.0	4.96	94.11		
カリウムイオン（K ⁺ ）	2.7	0.07	1.33		
アンモニウムイオン（NH ₄ ⁺ ）	0.6	0.03	0.57		
マグネシウムイオン（Mg ²⁺ ）	0.5	0.04	0.76		
カルシウムイオン（Ca ²⁺ ）	3.4	0.17	3.23		
陽イオン	計	121.2	5.27	100.00	

（ロ）陰イオン					
成分	ミリグラム（mg）	ミリバル（mval）	ミリバル％（mval％）		
フッ化物イオン（F ⁻ ）	0.4	0.02	0.38		
塩化物イオン（Cl ⁻ ）	50.5	1.42	27.05		
臭化物イオン（Br ⁻ ）	0.5	0.01	0.19		
硫化水素イオン（HS ⁻ ）	0.1	0.00	0.00		
硫酸イオン（SO ₄ ²⁻ ）	0.2	0.00	0.00		
リン酸水素イオン（HPO ₄ ²⁻ ）	1.2	0.03	0.57		
炭酸水素イオン（HCO ₃ ⁻ ）	227.0	3.72	70.86		
炭酸イオン（CO ₃ ²⁻ ）	1.6	0.05	0.95		
陽イオン	計	281.5	5.25	100.00	

5.泉質：単純温泉（低張性弱アルカリ性高温泉）					
6.禁忌症、適応症は別表による。					

平成30年11月21日
名古屋市北区辻町字流7番6
登録番号愛知県第1号愛知県衛生研究所長
皆川 洋子

成分に影響を与える項目

- 加水の状況

加水はしておりません。
- 加温の状況

加温はしておりません。
- 循環利用・ろ過の状況

循環利用・ろ過はしておりません。
- 入浴剂等添加の状況

入浴剂等の添加はしておりません。
- 消毒処理の状況

消毒はしておりません。

禁忌症、適応症及び入浴上の注意

- 浴用の禁忌症

病気の活動期（特に熱のあるとき）、活動性の結核、進行した悪性腫瘍又は高度の貧血など身体衰弱の著しい場合、少し動くとも息苦しくなるような重い心臓又は肺の病気、むくみのあるような重い腎臓の病気、消化管出血、目に見える出血があるとき、慢性の病気の急性増悪期
- 浴用の適応症

自律神経不安定症、不眠症、うつ状態、筋肉若しくは関節の慢性的な痛み又はこわばり（関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、神経痛、五十肩、打撲、捻挫などの慢性期）、運動麻痺における筋肉のこわばり、冷え性、末梢循環障害、胃腸機能の低下（胃がもたれる、腸にガスがたまるなど）、軽症高血圧、耐糖能異常（糖尿病）、軽い高コレステロール血症、軽い喘息又は肺気腫、痔の痛み、ストレスによる諸症状（睡眠障害など）、病後回復期、疲労回復、健康増進
- 浴用の一般的注意事項
 - 入浴前の注意
 - 食事の直前、直後及び飲酒後の入浴は避けること。酩酊状態での入浴は特に避けること。
 - 過度の疲労時には身体を休めること。
 - 運動後30分程度の間は身体を休めること。
 - 高齢者、子供及び身体の不自由な人は、1人での入浴は避けることが望ましいこと。
 - 浴槽に入る前に、手足から掛け湯をして温度に慣らすとともに、身体を洗い流すこと。
 - 入浴時、特に起床直後の入浴時などは脱水症状等にならないよう、あらかじめコップ一杯程度の水分を補給しておくこと。
 - 入浴方法
 - 入浴温度

高齢者、高血圧症若しくは心臓病の人又は脳卒中を経験した人は、42℃以上の高温浴は避けること。
 - 入浴形態

心肺機能の低下している人は、全身浴よりも半身浴又は部分浴が望ましいこと。
 - 入浴回数

入浴開始後数日間は、1日当たり1～2回とし、慣れてきたら2～3回まで増やしてもよいこと。
 - 入浴時間

入浴温度により異なるが、1回当たり、初めは3～10分程度とし、慣れてきたら15～20分程度まで延長してもよいこと。
 - 入浴中の注意
 - 運動浴を除き、一般に手足を軽く動かす程度にして静かに入浴すること。
 - 浴槽から出る時は、立ちくらみを起こさないようにゆっくり出ること。
 - めまいが生じ、又は気分が不良となった時は、近くの人に助けを求めつつ、浴槽から頭を低い位置に保ってゆっくり出て、横になって回復を待つこと。
 - 入浴後の注意
 - 身体に付着した温泉成分を温水で洗い流さず、タオルで水分を拭き取り、着衣の上、保温及び30分程度の安静を心がけること。
 - 脱水症状等为了避免するため、コップ一杯程度の水分を補給すること。
 - 湯あたり

温泉療養開始後おおむね3日～1週間前後に、気分不快、不眠若しくは消化器症状等の湯あたり症状又は皮膚炎などが現れることがある。このような状態が現れている間は、入浴を中止するか、又は回数を減らし、このような状態からの回復を待つこと。
 - その他

浴槽水の清潔を保つため、浴槽にタオルを入れないこと。
- 適応症、禁忌症決定年月日

令和元年7月10日